

**FICHA TÉCNICA**  
**ANTIMASTITIS S**  
Suspensión intramamaria

**COMPOSICIÓN:**

Cada 10g de pomada contienen:

Cloxacilina sódica-benzatina	400 mg
Sulfato de neomicina	200 mg
Excipientes c.s.p.	10 g

**ESPECIES PARA LAS CUALES ESTA INDICADO:**

Bovinos

**INDICACIONES:**

Indicado en bovinos para el tratamiento de mastitis subclínica en la época de secado, causadas por *Staphylococcus sp*, *Streptococcus sp*, *E. coli* y otros gérmenes sensibles a la asociación antibiótica.

**ADMINISTRACIÓN:**

Intramamaria



## DOSIFICACIÓN:

**Vacas:** 1 inyector por cuarto, en una sola administración.

El tratamiento debe realizarse al inicio del período de secado. Después del ordeño a fondo, antes de aplicar el producto, el cuarto debe ser lavado con una solución antiséptica. Tras aplicar el producto masajear la ubre a fin de mejorar la distribución de la suspensión. Aplicar vía intramamaria, previa desinfección externa de la ubre.

## TIEMPO DE RETIRO:

**CARNE:** 30 días

No administrar en hembras en producción de leche con destino al consumo humano.

No administrar dentro de los 30 días antes del parto.

## CONTRAINDICACIONES

No administrar en mastitis micóticas

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Consérvese a una temperatura inferior a 30°C

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS**

**PRESENTACIONES:** Caja de 12 jeringas por 10g

**REG.ICA:** 9340 MV

