

FICHA TÉCNICA **BACTICOL®** Solución inyectable

COMPOSICIÓN:

Cada ml de solución inyectable contiene:

Florfenicol	300 mg
Excipientes c.s.p.	1 ml



ESPECIES PARA LAS CUALES ESTA INDICADO:

Bovinos y porcinos

INDICACIONES:

En Bovinos y Porcinos para el tratamiento del complejo respiratorio y enfermedades gastrointestinales asociadas con bacterias susceptibles al Florfenicol: *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus somnus*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Mycoplasma hyorhinis*, *Salmonella choleraesuis* y *Streptococcus suis*

ADMINISTRACION:

Intramuscular y Subcutánea



DOSIFICACIÓN:

- **Vía Intramuscular:** (tabla del cuello) 20mg/kg. En la práctica administrar 1mL/15kg peso vivo, administrando 2 inyecciones con un intervalo de 48 horas. (Repartir dosis en varios puntos de aplicación, máx 10mL por punto)
- **Vía Subcutánea:** 40mg/kg. En la práctica administrar 2mL/15kg peso vivo como dosis única. Si no hay respuesta dentro de las 24 horas post aplicación, se debe confirmar el diagnóstico veterinario.

TIEMPO DE RETIRO:

CARNE:

- **Vía Intramuscular:** 30 días
- **Vía Subcutánea:** 38 días

LECHE:

No aplicar a vacas en producción de leche con destino al consumo humano.

EFFECTOS SECUNDARIOS:

- Disminución ingesta de alimento
- lesiones inflamatorias en sitio de inyección que persisten por 14 días



CONTRAINDICACIONES

- No usar en toros utilizados para fines reproductivos (no ha sido valorado sobre el rendimiento reproductivo)
- No usar en hembras en gestación

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Consérvese a una temperatura inferior a 30°C

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

PRESENTACION:

Frasco por 50 mL

REG.ICA 8999-MV



LIVISTO

Along with you

