

FICHA TÉCNICA **ESTROGEST®** Solución inyectable (Uso Veterinario)

ANALOGO SINTETICO DE LA PROSTAGLANDINA F2 α

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada mL de solución contiene:

D- coprostenol.....75 μ g
Excipientes c.s.p..... 1 mL

ESPECIES PARA LAS CUALES ES RECOMENDADO

Bovinos, Equinos y Porcinos

INDICACIONES Y DOSIS:

BOVINOS:

2mL vía Intramuscular

Inducción del estro: Tras determinar la presencia de CL (6°- 8° día del ciclo) administrar el producto. Generalmente se observa celo en 48-60hrs. Inseminar 72-96hrs después del tto.

- **Inducción parto:** Aplicar después del día 270 de gestación. El parto se debe dar entre las 30-60hrs post tratamiento.
- **Sincronización celo:** Administrar 2 veces el producto, con intervalo de 11 días.
- **Disfunción ovárica:** Tras determinar presencia de CL administrar el producto e Inseminar en el 1er celo post tratamiento.
- **Endometritis/piometra:** Administrar 1 dosis. Si es necesario repetir se debe hacer a los 10 días



- **Momificación fetal:** Administrar 1 dosis del producto, el feto debe ser expulsado a los 3-4 días.
- **Involución uterina retardada:** adm 1 dosis del producto, repetir el tratamiento 1 o 2 veces a la dosis de 1mL cada 24 horas.
- **Terapia combinada de quistes foliculares:** Adm el producto 10 días después de haber administrado GnRH

EQUINOS:

1mL vía Intramuscular

- **Inducción del estro:** Administrar el producto, deseable que se haya demostrado presencia de CL
- **Inducción al parto:** Administración después del día 320 de gestación. El parto tiene lugar unas horas después.
- **Interrupción de falsa gestación:** Administrar producto para obtener función ovárica normal
- **Anestro durante lactación:** Administrar producto 20-22d post parto, tras comprobar actividad cíclica.
- **Plan de inseminación:** Administrar 2 veces (14d de intervalo), inseminar 19-21 Días después del 1er tratamiento.

PORCINOS

1mL vía Intramuscular

Inducción al parto: Administración después del día 112 de gestación. El 70% de los casos el parto tiene lugar a las 19-30hrs

TIEMPO DE RETIRO

Los animales tratados no deben sacrificarse para el consumo humano hasta 24 horas después de finalizado el tratamiento. No tiene tiempo de retiro en leche.



CONTRAINDICACIONES:

Evitar el tratamiento en hembras gestantes, a menos que se desee provocar el aborto

EFECTOS SECUNDARIOS:

No se ha observado reacciones adversas incluso a dosis 10 veces superiores a la terapéutica en vacas y cerdas. En yeguas administrado 3 veces la dosis terapéutica, se ha detectado sudoración moderada y presencia de heces blandas.

INTERACCIONES:

No utilizar simultáneamente con AINES (inhibe la síntesis de PGF endógena)

ADVERTENCIAS ESPECIALES:

Se desaconseja utilizar ESTROGEST en yeguas que sufran enfermedades respiratorias y gastrointestinales serias. No emplear en animales bajo tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos

PRECAUCIONES:

Puede ser absorbido por la piel y puede producir broncoespasmo y aborto

CONSERVACIÓN:

Consérvese a una temperatura inferior a 30°C.

Manténgase fuera del alcance de los Niños y Animales domésticos.

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.

PRESENTACIONES:

Frasco x 20 mL

Reg. ICA: 8978 MV

