

RATAQUILL®

BRODIFACOUMA 0,005%

PELLETS (Cebo en trozos)

RODENTICIDA CON BRODIFACOUMA



Cebo rodenticida atrayente en forma de pellet (pequeños trozos) formulado a base de Brodifacouma al 0.005%, el cual provoca intoxicaciones a los roedores, hasta inducirlos a su muerte, producto de hemorragias internas al cabo de 2 a 3 días después de ingerido el cebo. Su fórmula grado alimenticio, satisface la dieta alimenticia de ratas y ratones por proteínas, cereales, y grasas garantizando una rápida ingestión por cualquier tipo de roedor.

- ✔ Listo para usar, no requiere mezclas ni aditivos.
- ✔ Palatabilidad superior para roedores del trópico.
- ✔ Ingrediente activo de última generación que garantiza intoxicación a ratas y ratones.
- ✔ Bolsa x10g ideal para aplicación en cualquier ambiente*.
- ✔ Tecnología BitterGuard®.



Display x 70 sobres x 10g
Display x 25 sobres x 20g
Display x 20 sobres x 50g
Display x 1 Bolsa x 1 Kg

MINAGRO Industria Química

Formulador y Distribuidor de **Plaguicidas**
Ambientalmente Sostenibles de uso:
Agrícola, Pecuario, Doméstico y Salud Pública.



RATAQUILL®

BRODIFACOUMA 0,005%

RODENTICIDA

PELLETS



IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Nombre comercial:	Rataquill® SB
Tipo de formulación:	Cebo rodenticida en pellets o trozos para el control de ratas y ratones
Ingrediente activo:	Brodifacouma
Grupo Químico:	Derivado de las cumarinas
No. CAS:	56073-10-0

COMPOSICIÓN

Brodifacouma	0.005%
Benzoato de Denatonium	0.001%
Atrayentes e Inertes	99.994%

CONFIGURACIÓN DE EMBALAJE



FICHA TÉCNICA

Para descargar la ficha técnica de este producto, escanee el código QR con su teléfono móvil ó acceda a nuestra página web, en la sección "Actualidad Informativa". Disponibles en descarga directa PDF.



ADVERTENCIA



Conserve el producto en el envase original etiquetado y cerrado, en un lugar oscuro, seco y fresco; alejado de alimentos, personas y animales. No almacenar cerca de los alimentos, bebidas o drogas de uso humano o animal.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO:

Rataquill® Pellets (cebo en trozos) elimina ratas y ratones a los pocos días de ingerido el cebo. Su fórmula grado alimenticio (cereales, proteínas, azúcares, grasas) garantiza una rápida atracción e ingestión del producto por parte de ratas y ratones, de esta manera Rataquill® se mimetiza de manera perfecta dentro de la dieta alimenticia del roedor, sin causarle ningún tipo de alerta o recelo, tanto a los roedores jóvenes como los mas viejos de la colonia. Rataquill® incorpora la tecnología BitterGuard®, sustancia amarga para seres humanos y animales domésticos como perros y gatos, pero imperceptible para ratas y ratones. BitterGuard® reacciona en las papilas gustativas de los humanos y de las mascotas, con un sabor amargo, ácido el cual provoca la no ingestión del producto.

ÁMBITOS DE APLICACIÓN



Instalaciones pecuarias



Cultivos Agrícolas



Bodegas y Almacenes



Hogares y Restaurantes



Cajas cebaderos

MECANISMO DE ACCIÓN:

Una vez es ingerido Rataquill®, la brodifacouma se metaboliza dentro del organismo del roedor, ocasionándole fuertes hemorragias hasta provocarle su muerte.

MODO DE APLICACIÓN:

Antes de iniciar la aplicación de Rataquill®, realice una inspección del área infestada con el objetivo de:

- Estimar la cantidad total de roedores.
- Ubicar correctamente los puntos de aplicación del cebo (cebaderos).
- Aplicar la cantidad correcta de cebo raticida Rataquill®.
- Establecer la frecuencia y reemplazo de los cebos.
- Detectar madrigueras, lugares de tránsito, etc.

Se recomienda al inicio del tratamiento si es posible, reducir la disponibilidad de alimentos alternativos como desperdicios, basuras, y sobras cerca de los puntos de aplicación del cebo. Con la ayuda, de guantes aplique de 10 a 50 gramos en los puntos cebaderos seleccionados como estratégicos y de tránsito. Coloque el cebo dentro de tubos de PVC, cajas plásticas cebaderas, guadas, etc cada 5 a 10 m para proveer un lugar seguro de alimentación a los roedores y evitar la ingestión accidental del cebo por parte de seres humanos o mascotas como perros y gatos. Marque los puntos de aplicación y notifique la aplicación a los residentes, administradores pecuarios, agricultores, etc sobre el tratamiento.

Realice inspecciones periódicas con el fin de monitorear el consumo del cebo y reemplazarlo por cebo fresco cada 5 a 7 días. Aplique nuevamente en los puntos donde haya observado consumo.

DOSIS DE APLICACIÓN:

La cantidad de cebo requerido depende del peso corporal del roedor, la cantidad total de roedores a controlar y la especie. Consulte el volante adjunto de "Rataquill® Uso Agrícola", "Rataquill® Uso Doméstico" y "Rataquill® Uso Pecuario" para conocer en detalle la dosificación según su uso.

MINAGRO Industria Química

Carrera 16 # 10 - 42, Bogotá D.C, Colombia
Email: minagro@minagroindustry.com
Tel: +57 1 3361021 / Movil: +57 311 237 93 22



www.minagroindustry.com

