

FICHA TÉCNICA NOBAC. CF® Suspensión inyectable (Uso Veterinario)

ANTIBIÓTICO DE AMPLIO ESPECTRO

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada mL de suspensión contiene:

Ceftiofur clorhidrato.....50 mg
Excipientes c.s.p..... 1 mL



ESPECIES PARA LAS CUALES ES RECOMENDADO

Bovinos, Equinos, ovinos, caprinos, porcino y caninos.

INDICACIONES:

En **Bovinos, ovinos y caprinos**. Para el tratamiento del Síndrome Respiratorio Bovino (fiebre de embarque y neumonía), asociadaas a *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* e *Histophilus somni*. Pododermatitis interdigital asociado a *Bacteroides melaninogenicus* y *Fusobacterium necrophorum* y Metritis/endometritis causadas principalmente por *Escherichia coli*, *Trueperella (Arcanobacterium) pyogenes* y *Fusobacterium necrophorum*

En **Porcinos** para el tratamiento de enfermedades respiratorias bacterianas causadas por *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Salmonella Cholerasuis* y *Streptococcus suis*.

En **Equinos** para el tratamiento de la septicemia en Potros, tratamiento de las infecciones respiratorias en caballos adultos y tratamiento de pleuritis y peritonitis, Así como metritis.



En **Caninos** para el tratamiento de infecciones del tracto urinario causadas por bacterias resistentes a otros antibacterianos

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION:

Bovinos: 1 a 2 ml/50 Kg de peso vivo, (equivalente a 1 - 2 mg de ceftiofur/Kg of p.v.); por vía I.M profunda o S.C cada 24 horas durante 3 a 5 días.

Equinos: 2mL/50 Kg de peso vivo (eq a 2,2 mg ceftiofur/Kg p.v) vía IM cada 24 horas en el tratamiento de infecciones respiratorias en caballos adultos.

Porcinos: 0,6mL a 1mL/10kg p.v (eq a 3-5 mg de ceftiofur/Kg de p.v) por vía intramuscular profunda cada 24 horas durante 3 a 5 días.

Caninos: 0,4mL/10kg p.v (eq a 2,2 a 4,4 mg/Kg) por vía subcutánea cada 24 horas.

TIEMPO DE RETIRO

Los Bovinos y Porcinos tratados no deben sacrificarse para el consumo humano durante el tratamiento y hasta 2 días después de finalizado el mismo. No requiere tiempo de retiro en leche.

PRECAUCIONES:

No administrar en animales con sensibilidad conocida al Ceftiofur.

No administrar en conjunto con aminoglicosidos

Consérvese a una temperatura entre 15 y 30°C protegido de la luz solar directa

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.

PRESENTACIONES:

Frasco x 50 y 100 mL

Reg. ICA: 8907-MV



LIVISTO

Along with you

