

FICHA TÉCNICA PORCIDIN® 5% Suspensión oral

COMPOSICIÓN:

Cada 100mL de suspensión oral contienen:

Toltrazuril	5 g
Excipientes c.s.p.	100mL

ESPECIES PARA LAS CUALES ESTA INDICADO:

Bovinos, Porcinos, Ovinos, Caprinos, Perros y Gatos

INDICACIONES:

Indicado para el tratamiento y control de la coccidiosis causada por:

Bovinos: *E.zuernii*, *E.bovis*, *E. ellipsoidalis*

Ovinos: *E. faurei*, *E. intricata*, *E. ovinoidalis*, *E. crandallis*, *E. granulosa*.

Caprinos: *E. ninakohlyakimovae*, *E. alijevi*, *E. arloingi*, *E. christenseni*

Porcinos: *Cystoisospora suis*

Caninos: *Cystoisospora canis*, *I. ohioensis*, *I. neorivolta*, *I. burrowsi*

Gatos: Para el tratamiento de *Cystoisospora felis*, *I. rivolta*, *Toxoplasma gondii*

ADMINISTRACIÓN:

Oral



DOSIFICACIÓN:

Se administra en dosis única vía oral

Bovinos (terneros): 15mg/kg, dosis práctica 3ml por cada 10kg peso vivo.

Porcinos (lechones): 20mg/kg, dosis práctica 1ml por cada 2,5kg peso vivo.

Administrar entre el 3° y 6° día de edad para el control de la enfermedad.

Caninos (cachorros): 20mg/kg, dosis práctica 1ml por cada 2,5kg peso vivo

Ovinos (corderos) y Caprinos (cabritos): 20mg/kg, dosis práctica 1ml por cada 2,5kg peso vivo

Gatos (cachorros): 10mg/kg, en la práctica 1ml por cada 5kg de peso.

Agitar antes de usar

TIEMPO DE RETIRO:

CARNE: 77 días

No administrar a bovinos en producción de leche para consumo humano.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Consérvese a una temperatura inferior a 30°C

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

PRESENTACIONES: Frasco por 100ml, 500ml y 1L

REG.ICA: 8666 MV

