

## FICHA TÉCNICA

# Q-CLORMUTIN

### Polvo Oral

**COMPOSICIÓN:**

Cada 1000 g de polvo contiene:

Tiamulina fumarato hidrogenado	33 g
Clortetraciclina HCl	100 g
Excipientes c.s.p.	1000 g

**INDICACIONES:**

Q-CLORMUTIN esta indicado para el control y tratamiento de las infecciones en aves y cerdos así:

**AVES:** control y tratamiento de enfermedades causadas por gérmenes como *Mycoplasma spp*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus (Avibacterium) paragallinarum*, *Escherichia coli*. En el control y tratamiento de enfermedad respiratoria crónica (ERC) y enfermedad complicada respiratoria crónica (ERCC) Coriza infecciosa y Cólera Aviar.

**CERDOS:** Control y tratamiento de infecciones del aparato respiratorio y del tracto gastrointestinal producidas por: *Mycoplasma hyopneumonie*, *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Bordetella bronchiseptica*, *Escherichia coli*, *Brachyspira hyodisenteriae*, *Branchyspira pilosicoli*. Para el control y tratamiento de ileitis, disentería porcina, colitis, pasteurelisis, rinitis atrófica, neumonía enzoótica y pleuroneumonía porcina.

**ESPECIES PARA LAS CUALES ESTÁ INDICADO:**

Aves y Cerdos

**ADMINISTRACIÓN:**

- Vía oral, mezclado en el alimento.
- Mezclar bien en la premezcla antes de incorporar el alimento.



## DOSIFICACIÓN:

### CERDOS:

**Neumonía enzoótica porcina, pleuroneumonía porcina, pasteurelosis, rinitis atrófica:** 200 ppm de tiamulina + 600 ppm de Clortetraciclina.

En la práctica usar 6 Kg del producto por tonelada de alimento por 7-10 días.

**Disenteria porcina, ileitis, colitis:** 100 a 120 ppm de tiamulina + 300 a 360 ppm de Clortetraciclina.

En la práctica 3 a 3.5 kg por tonelada de alimento durante 7 -10 días.

### AVES:

**ERC, Coriza infecciosa, Pasteurelosis:** 100 a 150 ppm de tiamulina + 300 a 450 ppm de clortetraciclina.

En la práctica 3 a 4,5 kg por tonelada de alimento, durante 7 a 10 días.

## PRECAUCIONES:

- Evitar el contacto con piel y mucosas.
- Usar guantes, gafas y mascarilla durante la incorporación y manipulación de la premezcla.
- No usar en aves de postura cuyos huevos se destinan al consumo humano
- No administrar a aves en periodo de postura.
- Consulte al médico veterinario.
- Venta bajo fórmula del Médico veterinario.
- Mantener en lugar fresco y seco.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

## CONTRAINDICACIONES:

No administrar con Narasina, Salinomicina o Monensina u otros anticoccidiales ionoforos.

## TIEMPO DE RETIRO:

**Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días después de finalizado el tratamiento.**



**AUROFARMA®**

BIENESTAR Y SALUD ANIMAL

**PRESENTACIÓN:**

Bolsa x 25 kg

**Reg ICA N° 8048 MV**

