

## FICHA TÉCNICA **Q-FLORFEN®** Polvo Oral

**COMPOSICIÓN:**

Cada g de polvo oral contienen:

Florfenicol	200 mg
Excipientes c.s.p.	1 g

**ESPECIES PARA LAS CUALES ESTA INDICADO:**

Aves, cerdos y peces

**INDICACIONES:**

**Q-FLORFEN** está indicado para el control y tratamiento de las infecciones causadas por:

**Cerdos:** Para el tratamiento de: *Actinobacillus pleuropneumoniae*; *Mannheimia haemolytica*; *Pasteurella multocida*; *Escherichia coli*; *Staphylococcus sp* y *Streptococcus sp*

**Aves:** para el tratamiento de las infecciones causadas por: *Escherichia coli*; *Pasteurella sp.*, *Avibacterium paragallinarum*; *Shigella sp*; *Staphylococcus sp*; *Streptococcus sp* y *Corynebacterium sp*

**Peces:** (Tilapia, Bagre, Trucha) para el tratamiento de infecciones causadas por: *Flavobacterium psychrophilum.*, *Flavobacterium columnare.*, *Aeromonas salmonicida.*, *Vibrio salmonicida.*, *Edwardsiella ictaluri.*, *Streptococcus iniae* y *Piscirickettsia salmonis.*

**ADMINISTRACION:**

Vía oral, mezclado en el alimento.

**DOSIFICACIÓN:**

Vía oral



**CERDOS Y AVES:** Dosis general: 20mg/kg de peso vivo. En la práctica 1-2 kg de Q-FLORFEN por tonelada de alimento. Suministrar por 7 días consecutivos.

**PECES:** Dosis general: 10mg/kg de peso vivo. En la práctica:

% Biomasa	Kg de Q-Florfen/Tonelada de alimento	Concentración de Florfenicol en alimento en PPM	Kg de peces medicados por 10 días/Tonelada de alimento
0.5%	10.0	2.000	20.000
1.0%	5.0	1.000	10.000
2.0%	2.5	500	5.000
3.0%	1.6	333	3.330
5.0%	1.0	200	2.000

Para recubrir la superficie de alimento: Para un % de Biomasa de 1%, agregue 125g de **Q-Florfen** por bolsa de 25Kg de alimento. Adicionar a la mezcla 1 Litro de melaza, mezclar para asegurar un recubrimiento uniforme.

#### **TIEMPO DE RETIRO:**

**Los aves y cerdos tratados no deben sacrificarse para el consumo humano hasta 5 días después de finalizado el tratamiento.**

**No usar en aves de postura cuyos huevos se destinen al consumo humano.**



**Los peces tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 12 días después de finalizado el tratamiento.**

**El agua de los estanques medicados no puede reincorporarse a las corrientes de agua naturales.**

## **PRECAUCIONES:**

**Lea el Prospecto antes de utilizar el producto. Evitar el contacto con piel y mucosas. Usar guantes, gafas y mascarilla durante la incorporación y manipulación de la mezcla. Venta bajo fórmula de Médico Veterinario. Consérvese a una temperatura inferior a 30°C. Manténgase fuera del alcance de los Niños y Animales domésticos**

## **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

**Consérvese a una temperatura inferior a 30°C  
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos**

## **PRESENTACION:**

**Saco x 25 Kg.**

**REG.ICA 8132-MV**

