

FICHA TÉCNICA
Q-SULFATYL®
Polvo Oral**COMPOSICIÓN:**

Cada 100 de polvo contienen:

Tilosina base (Como Tilosina fosfato 10g)	9.03 g
Sulfametazina base (Como Sulfametazina sódica 10g)	9.26 g
Excipientes c.s.p.	100 g

ESPECIES PARA LAS CUALES ESTA INDICADO:

Porcinos.

INDICACION:

En porcinos para el tratamiento de las infecciones causadas por: *Pasteurella multocida*, *Bordetella bronchiseptica* y *Trueperella pyogenes*.

VIA DE ADMINISTRACIÓN, DOSIFICACIÓN Y ESPECIES:

Vía oral, mezclado en el alimento. Mezclar bien en la premezcla antes de incorporar al alimento.

Suministrar 1 kg por tonelada de alimento; equivalentes a 100 g de Tilosina Fosfato y a 100 g de Sulfametazina sódica. Suministrar durante 7 días continuos.

TIEMPO DE RETIRO:

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 10 días después de finalizado el tratamiento.



PRECAUCIONES:

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.
Uso veterinario

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Consérvese en lugar fresco y seco protegido de la luz
Mantener fuera del alcance los niños y los animales domésticos.

PRESENTACION:

- Bolsa x 25 kg.

Reg. ICA: 8188 MV

