

## Ceftiofur

### Polvo estéril para Reconstituir

Reg ICA 7849 MV

### Uso Veterinario

## Composición Garantizada

Cada mL del polvo reconstituido contiene:

Ceftiofur sódico..... 50 mg

(como Ceftiofur base 47,9 mg)

Excipientes c.s.p..... 1 mL

## Indicaciones

En **Bovinos** para el tratamiento de infecciones respiratorias ocasionadas por: *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, e *Histophilus somni* y de Necrobacilosis interdigital asociada a *Fusobacterium necrophorum*, y *Bacteroides melaninogenicus*.

En **Porcinos** para el tratamiento de infecciones respiratorias asociadas con *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Streptococcus suis* tipo 2 y enteritis por *Salmonella choleraesuis*

En **Equinos** para el tratamiento de infección respiratoria asociada a *Streptococcus zooepidemicus*.

En **Perros** para el tratamiento de infecciones del tracto urinario asociadas con *Escherichia coli* y *Proteus mirabilis*.

## Especies destino



## Vía de administración y dosis

### RECONSTITUCIÓN:

#### Presentación de 1 g:

Disolver en 20 mL de diluyente estéril hasta homogenizar

#### Presentación de 4 g:

Disolver en 80 mL de diluyente estéril hasta homogenizar

Aplicación inyectable vía intramuscular:

#### BOVINOS:

Administrar 1 mL a 2 mL por cada 50 Kg de peso vivo cada 24 horas durante 3 a 5 días consecutivos. Equivalente a 1 a 2 mg/Kg

#### EQUINOS:

Administrar 2 mL a 4 mL por cada 50 Kg de peso vivo cada 24 horas durante 3 días. Equivalente a 2 a 4 mg/Kg. Aplicar en al menos dos sitios distantes.

#### PORCINOS:

Administrar 0,6 mL a 1 mL por cada 10 Kg de peso cada 24 horas durante 3 días consecutivos. Equivalente a 3 a 5 mg/kg

Aplicación inyectable vía subcutánea:

#### PERROS:

Administrar 0,4 mL por cada 10 Kg de peso vivo cada 24 horas durante 5 a 14 días, equivalente a 2,2 mg/kg.

## Presentaciones



Frasco de 1 g en 20 mL y 4 g en 80 mL

## Más información



## Ceftiofur

### Polvo estéril para Reconstituir

Reg ICA 7849 MV

### Uso Veterinario

## Composición Garantizada

Cada mL del polvo reconstituido contiene:

Ceftiofur sódico..... 50 mg

(como Ceftiofur base 47,9 mg)

Excipientes c.s.p..... 1 mL

## Tiempo de retiro

- Animales destinados para consumo no deberán sacrificarse hasta 4 días después de finalizado el tratamiento.
- No tiene tiempo de retiro en leche

## Contraindicaciones

- No utilizar en animales con hipersensibilidad a los betalactámicos
- No utilizar vía intravenosa

## Precauciones / Advertencias

- Manténgase fuera del alcance de los niños y de animales domésticos
- No utilizar en equinos destinados a consumo humano
- Venta bajo fórmula del Médico Veterinario
- Consérvese en un lugar fresco y seco protegido de la luz y a una temperatura inferior a 30° C.
- Una vez reconstituido, se recomienda almacenar en refrigeración de 2° a 8° C máximo durante 5 días

## Presentaciones



Frasco de 1 g en 20 mL y 4 g en 80 mL

## Más información

