

Antibiótico Antidiarreico

Polvo soluble oral

Reg ICA 10476 MV

Uso Veterinario

Composición Garantizada

Cada g de polvo oral contiene
Sulfaguanidina..... 660 mg
Pectina..... 20 mg
Cloruro de Sodio..... 3.6 mg
Cloruro de Sodio..... 2.8 mg
Excipientes c.s.p..... 1 g

Indicaciones

En **Lechones, Potros, Perros, Terneros y Corderos No rumiantes** para el tratamiento de infecciones gastrointestinales ocasionadas por: *Escherichia coli*, *Shigella sp.*, *Proteus sp.*, *Staphylococcus sp.*, *Streptococcus sp.*

Para el tratamiento de coccidiosis provocadas: En **Lechones:** *Eimeria suis*, *Cystoisospora suis*. En **Terneros:** *E. zuernii* y *E. bovis*. En **Corderos:** *E. ovinodalis* y *E. ahsata*.

Especies destino



Vía de administración y dosis

Polvo oral para disolver en el agua de bebida.

Vía oral

Dosis Inicial:

Administrar 2 g por cada 5 Kg de peso vivo cada 12 horas durante el primer día de tratamiento

Mantenimiento:

Administrar 1 g por cada 5 Kg de peso vivo cada 12 horas durante 5 días consecutivos.

Tiempo de retiro

- No administrar en animales destinados para consumo humano

Contraindicaciones

- No utilizar en animales con hipersensibilidad a los componentes

Precauciones / Advertencias

- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos
- Consérvese en un lugar fresco y seco protegido de la luz y a una temperatura inferior a 30° C.
- Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Presentaciones



Caja de sobres 20 g por 10 y por 50 unidades

Más información

