

Ivermectina

Endectocida

Reg ICA 5304 DB

Uso Veterinario

Composición Garantizada

Cada mL de solución inyectable contiene:

Ivermectina..... 10 mg

Excipientes c.s.p..... 1 mL

Indicaciones

Está indicado en el tratamiento y control de parásitos internos y externos del ganado bovino y porcino.

En **BOVINOS** para el tratamiento de: **Parásitos Gastrointestinales:** *Ostertagia ostertagi*, *Ostertagia lyrata*, *Haemonchus placei*, *Mecistocirrus digitatus*, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Oesophagostomum radiatum*, *Cooperia oncophora*, *Cooperia punctata*, *Cooperia pectinata*, *Bunostomum phlebotomum*, *Nematodirus spathiger*, *Strongyloides papillosus*, *Toxocara vitulorum*, *Parafilaria bovicola* y *Thelazia sp.*

Parásito Pulmonar: *Dictyocaulus viviparus*. **Ectoparásitos:** Nuche (*Dermatobia hominis*), piojos chupadores (*Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus*, *Solenoptes capillatus*, *Damalinea bovis*), ácaros de la sarna (*Psoroptes communis* var *Bovis*, *Sarcoptes scabiei*, *Chorioptes bovis*) miasis (*Cochliomyia hominivorax*) y garrapatas (*Rhipicephalus (Boophilus) microplus*)

En **CERDOS** para el tratamiento de: **Parásitos Gastrointestinales:** *Ascaris suum*, *Hyostrongylus rubidus*, *Oesophagostomum sp.*, *Strongyloides ransomi*, *Trichuris suis*. **Parásitos Pulmonares:** *Metastrongylus sp.* **Parásitos del riñón:** *Stephanurus dentatus*. **Ectoparásitos:** Piojos (*Haematopinus suis*) y ácaros de la sarna (*Sarcoptes scabiei* var *suis*).

Especies destino



Tiempo de retiro

- En **Bovinos:** 22 días para carne. No administrar en vacas cuya leche se destine para el consumo humano, ni en los 28 días anteriores al parto.
- En porcinos: 28 días.

Contraindicaciones

- No se recomienda emplear en animales en gestación temprana
- No aplicar vía intravenosa ni vía intramuscular

Precauciones / Advertencias

- No emplear en equinos
- Manténganse fuera del alcance de los niños
- Consérvese en un sitio fresco y seco protegido de la luz a una temperatura menor a 30° C
- Venta bajo fórmula del médico veterinario
- En caso de inyección accidental acuda al médico de inmediato

Presentaciones



Frasco por 50 mL y 250 mL

Más información

