

## Fenbendazol 25%

### Antiparasitario en Suspensión Oral

Reg ICA 6631 MV

Uso Veterinario

## Composición Garantizada

Cada 100 mL de suspensión oral contiene:

Fenbendazol micronizado..... 25 g

Excipientes c.s.p..... 100 mL

## Indicaciones

Antiparasitario oral indicado en el tratamiento y control de:

**BOVINOS Y OVINOS:** *Bunostomum sp., Trichostrongylus sp., Nematodirus sp., Trichuris sp., Chabertia sp., Cooperia sp., Oesophagostomum sp., Haemonchus sp., Ostertagia sp., Strongyloides sp., Neoscaris sp., Dictyocaulus viviparus, Moniezia sp., Taenia hydatigena, Taenia saginata.*

**PORCINOS:** *Hyostrongylus sp., Ascaris suum, Oesophagostomum sp., Trichuris sp., Metastrongylus sp.*

**EQUINOS:** *Strongylus sp., Oxyuris sp., Parascaris equorum, Strongyloides sp.*

## Especies destino



## Vía de administración y dosis

Administrar vía oral o intrarruminal (Bovinos y Ovinos)

**BOVINOS:** Administrar 1 mL por cada 50 Kg de peso vivo, equivalente a 5 mg/Kg

**EQUINOS:** Administrar 4 mL por cada 100 Kg de peso vivo, equivalente a 10 mg/Kg

**OVINOS:** Administrar 2 mL por cada 100 Kg de peso vivo, equivalente a 5 mg/Kg

**CERDOS:** Administrar 2 mL por cada 100 Kg de peso vivo, equivalente a 5 mg/Kg

## Tiempo de retiro

- Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 11 días después de finalizado el tratamiento.
- La leche producida durante el tratamiento hasta 96 horas después no debe destinarse a consumo humano.

## Contraindicaciones


- No se recomienda emplear en hembras gestantes antes del último tercio de gestación
- No usar en caso de hipersensibilidad a los componentes.
- No utilizar en animales en periodo de lactancia.

## Presentaciones



Frasco por 50 mL y 250 mL

## Más información



## Fenbendazol 25%

### Antiparasitario en Suspensión Oral

Reg ICA 6631 MV

### Uso Veterinario

## Precauciones / Advertencias

- Manténgase fuera del alcance de niños y animales domésticos
- Agite bien el envase hasta homogenizar el producto antes de cada uso
- Consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura inferior a 30° C.
- La frecuencia, dosis y duración del tratamiento según criterio Médico Veterinario
- Venta bajo fórmula del médico veterinario

## Presentaciones



Frasco por 50 mL y 250 mL

## Más información

