

## Amprolio 20%

### Coccidiostático en Polvo Oral

Reg ICA 2646 DB

### Uso Veterinario

## Composición Garantizada

Cada 1 g de polvo oral contiene:

Amprolio..... 200 mg

Excipientes c.s.p..... 1 g

## Indicaciones

Indicado para el tratamiento y control de coccidiosis, en aves (Pollos, pollas de reemplazo, ponedoras y reproductoras) coccidiosis ocasionadas por: *Eimeria tenella*, *E. necatrix*, *E. acervulina* y *E. brunetti*. En Bovinos controla *E. bovis*, *E. zuernii* y en Ovinos para *E. ovinodalis* y *E. ahsata*.

## Especies destino



## Vía de administración y dosis

Administración vía oral en el agua de bebida.

**BOVINOS Y OVINOS:** Disolver 1 g en 1 L de agua de bebida por cada 20 Kg de peso durante 5 días consecutivos, equivalente a 10mg/Kg de amprolio

**AVES:** Disolver 1 g en 1 L de agua de bebida durante 7 días consecutivos, equivalente a 10 mg/Kg de Amprolio

## Tiempo de retiro

- Los animales tratados no deben sacrificarse para el consumo humano hasta **24 horas después** de finalizado el tratamiento.
- No requiere tiempo de retiro en leche.

## Contraindicaciones

- No usar en caso de hipersensibilidad a los componentes.
- No utilizar en aves ponedoras en producción de huevos destinados al consumo humano.

## Precauciones / Advertencias

- Manténgase fuera del alcance de niños y animales domésticos
- Consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura inferior a 30° C.
- Venta bajo fórmula del médico veterinario.
- La disposición final de los empaques vacíos o con contenido residual, deberá efectuarse según las normas ambientales vigentes.

## Presentaciones



25 g, 1000 g

## Más información

