

FICHA TÉCNICA **DOLFEN®** Solución inyectable (Uso Veterinario)

ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDAL

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada mL de solución contiene:

Ketoprofeno.....100 mg
Excipientes c.s.p..... 1 mL

ESPECIES PARA LAS CUALES ES RECOMENDADO

Bovinos, Equinos, Porcinos, caninos y felinos

INDICACIONES Y DOSIS:

BOVINOS: Vía intravenosa o intramuscular

Tratamiento en casos de procesos inflamatorios asociados a enfermedades respiratorias, edemas mamarios, mamitis agudas y procesos inflamatorios musculoesqueléticos: 3 ml/100 Kg al día durante 1-3 días consecutivos



EQUINOS: Vía intravenosa

Tratamientos en casos de procesos inflamatorios dolorosos de los sistemas osteoarticular y musculoesquelético; cojeras, artritis, artrosis, esguinces, fracturas, tendinitis, accidentes con herraduras y pododermatitis: 1 ml/45 Kg de 3-5 días vía I.V

Tratamiento de cólicos: 1 ml/45 Kg en dosis única.

PORCINOS: Vía intramuscular

Tratamiento de inflamaciones, hipertermia, afecciones respiratorias, cojeras, artritis, mastitis, metritis y agalactia de la cerda (MMA): 0.3 ml/10 Kg de 1-3 días consecutivos

CANINOS Y FELINOS: Vía intramuscular

Tratamiento de inflamaciones, artrosis, poliartritis, luxaciones y esguinces. Todo tratamiento de los estados inflamatorios y dolorosos de los sistemas osteoarticular y musculoesquelético: 0.02 ml/10 Kg durante 1-3 días consecutivos.

TIEMPO DE RETIRO

Los Bovinos y Porcinos tratados no deben sacrificarse para el consumo humano durante el tratamiento y hasta 4 días después de finalizado el mismo.

No requiere tiempo de retiro en leche



EFFECTOS SECUNDARIOS

El Ketoprofeno es un fármaco seguro del que no se ha recogido la aparición de efectos secundarios cuando se administra en forma terapéutica. En la administración intramuscular puede aparecer un edema local con dolor a la palpación y tumefacción en un radio de 10cm que desaparece a la semana de finalizar el tratamiento.

USO EN GESTACIÓN Y LACTANCIA

En ausencia de datos específicos en la yegua gestante y en potros, no utilizar el producto durante la gestación ni en potros menores de 15 días.

INTERACCIONES

No administrar de forma conjunta con otros antiinflamatorios no esteroideos, con diuréticos o con anticoagulantes.

CONSERVACIÓN Y RECOMENDACIONES

Consérvese a una temperatura inferior a 30°C.

Manténgase fuera del alcance de los Niños y Animales domésticos.

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.

PRESENTACIONES: Frasco x 50 y 100mL

Reg. ICA: 9202 - MV

