

## Doxiciclina Hiclato 60%

### Antibiótico en Polvo Oral

Reg ICA 10576 MV

### Uso Veterinario

## Composición Garantizada

Cada 100 g de polvo oral contiene:

Doxiciclina Hiclato..... 60 g

(Doxiciclina base 52 g)

Excipientes c.s.p..... 100 g

## Indicaciones

En **Pollos de engorde, Parrilleros, Reproductores y Pavos** para el tratamiento de las siguientes enfermedades: Enfermedad respiratoria crónica (*Mycoplasma gallisepticum*), Sinovitis infecciosa (*M. synoviae*), Cólera aviar (*Pasteurella multocida*) Colibacilosis (*E. coli*), Pullorosis (*Salmonella pullorum*) y Coriza infecciosa (*Avibacterium paragallinarum*).

En **Cerdos** para el tratamiento de las siguientes enfermedades: Rinitis atrófica (*Pasteurella multocida*), Neumonía Enzootica (*Mycoplasma hyopneumoniae*) Colibacilosis (*E. coli*), Salmonelosis (*Salmonella spp.*), Clamidirosis (*Chlamydia spp.*), Pleuroneumonía (*Actinobacillus pleuropneumoniae*), Leptospirosis, Síndrome MMA (Mastitis, Metritis, Agalactia), Poliartritis y Erisipela.

En **Terneros pre-rumiantes** en el tratamiento de infecciones respiratorias y gastrointestinales causadas por especies sensibles como *Anaplasma spp.*, *Pasteurella multocida*, *E. coli*, *Salmonella spp.*, *Mannheimia haemolytica*, *Histophilus somni* y *Mycoplasma spp.*

## Especies destino



## Vía de administración y dosis

Premezcla para el alimento o disuelto en el agua de bebida.

**AVES:** Mezclar 160 a 330 g por Tonelada de alimento o de 80 a 180 g disueltos en 1000 L de agua de bebida durante 3 a 5 días. Equivalente a 10 a 20 mg/Kg de Doxiciclina.

**CERDOS:** Mezclar 410 g a 830 g por Tonelada de alimento o de 160 a 330 g disueltos en 1000 L de agua de bebida o de 1 a 3 g por cada 60 Kg de peso vivo. Equivalente a 10 a 20 mg/Kg de Doxiciclina.


**TERNEROS PRE-RUMIANTES:** Administrar 1 g por cada 60 kg de peso vivo diluidos en 10 L de agua de bebida durante 3 a 5 días. Equivalente a 10 mg/Kg de Doxiciclina.

## Presentaciones



100 g, 200 g, 500 g, 1 Kg, 2 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 12,5 Kg

## Más información



## Doxiciclina Hiclato 60%

### Antibiótico en Polvo Oral

Reg ICA 10576 MV

### Uso Veterinario

## Tiempo de retiro

- Las aves tratadas no deben sacrificarse para consumo humano **hasta 6 días después** de finalizado el tratamiento.
- Los cerdos y terneros tratados no deben sacrificarse para consumo humano **hasta 9 días después** de finalizado el tratamiento.
- No administrar a aves en producción de huevo destinado al consumo humano.

## Contraindicaciones

- No administrar en animales con historial de hipersensibilidad a las tetraciclinas.
- No administrar en animales con alteraciones hepáticas.
- No administrar en bovinos con rumen funcional.
- No administrar en conjunto con antiácidos, caolín y preparaciones de hierro.
- **Interacciones:** La absorción de la Doxiciclina se puede disminuir en presencia de altas concentraciones de Calcio, Hierro, Magnesio o Aluminio de la dieta.

## Precauciones / Advertencias

- Preparar soluciones medicadas diariamente, disolver homogéneamente el producto en el agua.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.
- El uso de este medicamento debe basarse en pruebas de sensibilidad.
- Durante la manipulación y administración del producto se deben utilizar guantes de goma gafas y mascarilla de seguridad.
- Cambiar la ropa tras la administración del medicamento.
- Lavar cuidadosamente las manos después de su manipulación.
- No fumar, beber, ni comer durante su manipulación.
- Puede provocar osificación temprana en animales jóvenes.
- Consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura inferior a 30 °C.

## Presentaciones



100 g, 200 g, 500 g, 1 Kg, 2 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 12,5 Kg

## Más información

