

FICHA TÉCNICA
ERIPANTO®
Polvo soluble
Uso Veterinario

Antibiótico de amplio espectro

COMPOSICIÓN:

Cada g de polvo oral contiene:

Eritromicina estearato	85 mg
Excipientes	1 g

ESPECIES PARA LAS CUALES ES RECOMENDADO:

Aves.

INDICACIONES:

En aves para el tratamiento de las infecciones causadas por *Staphylococcus sp.*, *Streptococcus sp.*, *Corynebacterium sp.*, *Mycoplasma sp* y *Haemophilus sp.*

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

DOSIFICACIÓN:

1.2g a 2,4g por 1 L de agua durante 5 días continuos.

TIEMPO DE RETIRO:

Las aves tratadas no deben sacrificarse para consumo humano hasta 3 días después de finalizado el tratamiento. No administrar a aves en periodo de postura.



PRECAUCIONES:

Uso veterinario.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Consérvese en sitio fresco y seco protegido de la luz.

Cambiar diariamente el agua medicada.

PRESENTACIONES:

Caja dispensadora x 40 sobres de 24 g

COLOMBIA Reg. ICA 2347 DB

AUROFARMA®

Plan Colectivo 
de Gestión de Devolución Posconsumo
de Medicamentos Veterinarios Vencidos



Laboratorios Aurofarma S.A.S está comprometido con el programa colectivo de Gestión de devolución Posconsumo de Medicamentos vencidos, y sus envases con o sin residuos de Medicamentos de uso veterinario, con Aprove

