

FICHA TÉCNICA **IMIDOCARB-LH®** Solución inyectable (Uso Veterinario)

HEMOPARASITICIDA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada mL de solución inyectable contiene:

Dipropionato de imidocarb.....120 mg
Excipientes c.s.p..... 1 mL

ESPECIES PARA LAS CUALES ES RECOMENDADO

Bovinos, equinos y caninos

INDICACIONES:

Tratamiento de los animales clínicamente afectados por babesiosis, y anaplasmosis. Puede utilizarse como control quimioproláctico cuando el ganado susceptible es introducido en áreas enzoóticas o con riesgo de anaplasmosis y piroplasmosis.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Bovinos y caninos: Vía Subcutánea

Equinos: Intramuscular



DOSIS

Bovinos:

Babesiosis: 1mL/100kg peso vivo vía S.C o I.M (2mg/kg)

Anaplasmosis: 2,5mL/100kg peso vivo vía S.C (3mg/kg)

Mixto: 2,5mL/100kg peso vivo vía S.C (3mg/kg)

Quimioprofilaxis: 2,5mL/100kg peso vivo vía S.C (3mg/kg)

Equinos:

Babesiosis: 2mL/100kg peso vivo vía S.C (2,4mg/kg) Puede repetir dosis con intervalo de 48hrs (Babesia equi)

Quimioprofilaxis: 2mL/100kg peso vivo vía S.C (2,4mg/kg)

Caninos:

Babesiosis: 0,5mL/20kg vía S.C (3mg/kg)

TIEMPO DE RETIRO

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 165 días después de finalizado el tratamiento.

La leche producida durante el tto y 96 horas después de finalizado el mismo, no debe darse al consumo humano

PRECAUCIONES:

No aplicar por vía intravenosa

No aplicar simultáneamente con insecticidas organofosforados

Manténgase fuera del alcance de los Niños y Animales domésticos.

Consérvese a una temperatura inferior a 30°C.

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.

PRESENTACIONES:

Frascos por 50 y 100 mL

Reg. ICA: 8749 MV



LIVISTO

Along with you

