

Antibiótico y Antiinflamatorio

Antibiótico en Solución Inyectable

Reg ICA 6292 MV

Uso Veterinario

Composición Garantizada

Cada mL de solución inyectable reconstituida contiene:

Penicilina G Procaínica.....	166667 UI
Penicilina G Potásica.....	166667 UI
Estreptomicina.....	334 mg
Dexametasona.....	0,8 mg
Excipientes c.s.p.....	1 mL

Indicaciones

Para el tratamiento de las infecciones causadas por: *Streptococcus sp*, *Staphylococcus sp*, *Clostridium sp*, *Pasteurella sp*, *Corynebacterium sp*, *Fusobacterium sp*, *Haemophilus sp*, *Campylobacter sp* (*Vibrio*), *Leptospira sp*, *Erysipelothrix sp*, *Listeria sp*, *Nocardia sp*, *Actinobacillus sp*, *Bacillus anthracis*.

Especies destino



Vía de administración y dosis

Vía intramuscular profunda

Administrar 1 a 2 mL por cada 30 Kg cada 24 horas durante 3 a 5 días. Equivalentes a 11000 a 22000 UI/Kg

Tiempo de retiro

- Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta **30 días después** de finalizado el tratamiento.
- La leche producida durante el tratamiento y **72 horas después** de finalizado mismo no debe destinarse para consumo humano.

Contraindicaciones

- No utilizar en animales con hipersensibilidad a los componentes.
- No utilizar en hembras gestantes en el último tercio gestacional
- No usar
- Usar con precaución en animales con enfermedad renal

Precauciones / Advertencias

- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos
- Consérvese en un lugar fresco y seco protegido de la luz y a una temperatura inferior a 30° C.
- No combinar con otros antimicrobianos.
- No combinar con otros corticoides ni AINEs
- Una vez reconstituido el producto puede tomar amarillo, pero no pierde potencia.
- Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.

Presentaciones



4000000 UI y 8000000 UI

Más información

