

Toltrazuril 5%

Coccidicida en Suspensión Oral

Reg ICA 8666 MV

Uso Veterinario

Composición Garantizada

Cada 100 mL de suspensión oral contiene:

Toltrazuril..... 5 g

Excipientes c.s.p..... 100 mL

Indicaciones

Indicado para el tratamiento y control de la coccidiosis causada por: **Bovinos:** *E.zuernii*, *E.bovis*, *E. ellipsoidalis* **Ovinos:** *E. faurei*, *E. intricata*, *E. ovinoidalis*, *E. crandallis*, *E. granulosa*. **Caprinos:** *E. ninakohlyakimovae*, *E. alijeji*, *E. arloingi*, *E. christenseni*. **Porcinos:** *Cystoisospora suis* **Caninos:** *Cystoisospora canis*, *I. ohioensis*, *I. neorivolta*, *I. burrowsi* **Gatos:** Para el tratamiento de *Cystoisospora felis*, *I. rivolta*, *Toxoplasma gondii*

Especies destino



Vía de administración y dosis

Administrar vía oral directamente

BOVINOS (terneros): Administrar 3mL por cada 10kg peso vivo, equivalente a 5 mg/Kg.

PORCINOS (lechones): Administrar 1 mL por cada 2,5 Kg de peso. Se recomienda aplicar desde el 3º al 6º día de edad para control de la enfermedad, equivalente a 20 mg/Kg

CANINOS: Administrar 1 mL por cada 2,5 Kg peso vivo, equivalente a 20 mg/Kg

OVINOS (corderos) CAPRINOS (cabritos): Administrar 1 mL por cada 2,5 Kg de peso vivo. Equivalente a 20 mg/Kg

GATOS: Administrar 1 mL por cada 5 Kg de peso vivo, equivalente a 10 mg/Kg

Tiempo de retiro

- Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta **77 días después** de finalizado el tratamiento.
- No utilizar en animales en producción de leche para consumo humano

Contraindicaciones

- No usar en caso de hipersensibilidad a los componentes.

Precauciones / Advertencias

- Manténgase fuera del alcance de niños y animales domésticos
- Consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura inferior a 30° C.
- Venta bajo fórmula del médico veterinario.
- Frecuencia y dosis pueden variar a criterio del médico veterinario

Presentaciones



100 mL y 1000 mL

Más información

