

Q-IVERMEC 3.50®

AUROFARMA®

Ivermectina 3.50%

Endoparasitocida en Solución Inyectable

Reg ICA 8008 MV

Uso Veterinario

Composición Garantizada

Cada 100 mL de solución inyectable contiene:

Ivermectina..... 35 g

Excipientes c.s.p..... 100 mL

Indicaciones

Para tratamiento y control de los parásitos internos y externos de bovinos.

Parásitos Gastrointestinales: *Ostertagia ostertagi*, *Ostertagia lyrata*, *Haemonchus placei*, *Mecistocirrus digitatus*, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Cooperia onchophora*, *Cooperia punctata*, *Cooperia pectinata*, *Bunostomum phlebotomum*, *Oesophagostomum radiatum*, *Nematodirus helvetianus*, *Nematodirus spathiger*, *Strongyloides papillosus*, *Toxocara vitulorum*.

Parásito Pulmonar: *Dictyocaulus viviparus*.

Otros Nematodos: *Parafilaria bovicola*, *Thelazia sp.*

Nuches: Ayuda en el control de *Dermatobia hominis* e *Hypoderma sp.*

Piojos chupadores: *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus*, *Solenoptes capillatus*.

Piojos Masticadores: Ayudan en el control de *Damalina bovis*.

Ácaros de la sarna: *Psoroptes communis* var *bovis*, *Sarcoptes scabiei* var *bovis*, ayuda en el control de *Chorioptes bovis*.

Miasis: *Cochiliomyia hominivorax*.

Garrapatas: Ayuda en el control de *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*.

Especies destino



Vía de administración y dosis

Administrar vía subcutánea únicamente

Administrar 1 mL por cada 50 Kg de peso vivo, equivalente a 200 ug/Kg de Ivermectina

Tiempo de retiro

- Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta **122 días después** de finalizado el tratamiento.
- No administrar a vacas en producción de leche destinadas al consumo humano, ni **122 días antes del parto**.

Contraindicaciones


- No usar en caso de hipersensibilidad a los componentes.
- No utilizar en periodo

Presentaciones



50 mL, 250 mL, 500 mL

Más información



Q-IVERMEC 3.50®

AUROFARMA®

Ivermectina 3.50%

Endoparasitocida en Solución Inyectable

Reg ICA 8008 MV

Uso Veterinario

Precauciones / Advertencias

- Manténgase fuera del alcance de niños y animales domésticos
- Consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura inferior a 30° C.
- Evite el contacto directo con la piel y ojos.
- Evite fumar o comer después de manipular del producto.
- Venta bajo fórmula del médico veterinario.
- Frecuencia y dosis pueden variar a criterio del médico veterinario

Presentaciones



50 mL, 250 mL, 500 mL

Más información

